

На Закарпатті – нашествия небезпечних комах!

Комахи швидко розплодилися через сприятливу для них погоду - паводки та великі розливи річок.

Це мошки-сімуліди (*Simulium posticatum*), на місці укусів яких на тілі утворюються значні алергічні реакції, що супроводжуються сильним свербжем, почервонінням (аж до синців), набрякlostями.

Комахи швидко розплодилися на Закарпатті через сприятливу для них погоду - паводки та великі розливи річок. На щастя, інфекції ці мошки не переносять. Але наслідки їх укусів надзвичайно неприємні: залишаються великі червоні сліди, ранки довго не гояться. Причому багато хто навіть не помічає, коли їх атакували комахи. Єдиний вихід - все ті ж репеленти. Слина мошки: токсична, оскільки в ній міститься гемолітична отрута. Під час укусу в ранку потрапляє речовина, яка дає тимчасовий знеболюючий ефект. Крім нього в слині мошки містяться ферменти, що запобігають згортанню крові. Через деякий час на місці укусу з'являється свербіж, болючість, а також відчуття печіння. Шкіра навколо укусу червоніє, температура укушеної ділянки тіла підвищується. Поступово ділянка набрякає, причому набряк може зберігатися кілька днів, а свербіти це місце може ще декілька тижнів. Дуже важко відмовитися від спокуси почухати місце укусу, але робити це все ж не слід, щоб не допустити утворення виразок, в які можна занести інфекцію.

Що стосується медикаментозних засобів, то можна порекомендувати обробити місце укусу нашатирним спиртом. У разі виникнення алергічної реакції необхідно прийняти антигістамінні препарати.

Джерело

<http://karpatnews.in.ua/news/120547-na-zakarpatti-nashestia-nebezpechnykh-komak.htm>